



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین  
دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه :

جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

عنوان :

مروری بر افزایش حجم لثه ناشی از مصرف دارو همراه با گزارش مورد

استاد راهنما :

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر جلال الدین حمیصی

نگارش :

پریناز صدقی اصل

شماره پایان نامه : ۴۶

سال تحصیلی : ۱۳۷۶-۷۷

## خلاصه و نتیجه

در بررسی لامهای میکروسکوپی ۴ نمونه مربوط به بیماران مصرف کننده فنی تونین نکات زیر حائز اهمیت می باشد :

\* اپی تلیوم دارای اکانتوز شدید (افزایش سلولهای لایه خاردار) و بلند شدن طول Rete Peg ها می باشد به طوری که بعضاً حالت Pseudo epithelialiomatous hyperplasia به خود گرفته است. اپی تلیوم کراتوتیک می باشد که با توجه به برداشت نمونه ها از لته طبیعی است.

در بعضی مناطق اپی تلیوم زخمی است که انفیلتراسیون التهابی مشهود می باشد.  
\* بافت همبند با افزایش باندهای کلاژن و همچنین فیبروبلاستها مشخص می گردد که انفیلتراسیون التهابی آماس مزمن بصورت کانونی و پراکنده در بافت دیده می شود.  
\* التهاب و تغییرات اپی تلیالی با نزدیک شدن به ناحیه Sulcus بیشتر می شود.  
تغییرات اپی تلیالی شامل واکوئولیزه شدن سلولهای اپی تلیالی و ایجاد فاصله بین سلولها می باشد.

\* وجود التهاب در بافت همبند بعضاً باعث افزایش عروق خونی و حالت ادماتوز در بافت همبند گردیده است.

نتیجه : افزایش حجم لته در این حالت ناشی از افزایش بافت همبند و اپی تلیال هر دو می باشد که درجات مختلفی از التهاب نیز در بافت همبند دیده می شود.